

Numeral Analysis

Cheating Paper

Author: cht

Date: 1

2024-2025 Autumn Semester

Table of Contents

1) 浮点数表示和方程求解	4
2) 一元方程求解	5
3) 一元方程迭代法收敛性分析 & 矩阵求解初步	7
4) Choleski 分解 & 迭代线性系统解法初步	9
5) 矩阵迭代解法与插值	9
6) 条件数与特征向量	10
7) 拉格朗日插值+牛顿多项式插值法+Hermit 插值	11
8) Hermit+Cubic Spline 插值+逼近初步	13
9) 逼近+Chebyshev 多项式	18
10) chebyshev 多项式+数值微分与积分	20
11) 数值积分	23
12) 微分方程数值解法: 显式法与隐式法	26
13) 微分方程数值解法: Runge-Kutta 法和稳定性	27

1) 浮点数表示和方程求解

3) let x be the interval loss

a. $\frac{x}{150} \leq 10^{-3}$
 $x \leq 0.15$, (149.85, 150.15)

b. $\frac{x}{900} \leq 10^{-3}$
 $x \leq 0.9$ (899.1, 900.9)

c. $\frac{x}{1500} \leq 10^{-3}$
 $x \leq 1.5$ (1498.5, 1501.5)

d. $\frac{x}{90} \leq 10^{-3}$
 $x \leq 0.09$ (89.91, 90.09)

11) a. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{x(1 - \frac{1}{5}x^2 + o(x^2)) - (x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3))}{x - (x - \frac{1}{5}x^3 + o(x^3))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{5}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{5}x^3 + o(x^3)}$
 $= \frac{x(1 - \frac{1}{5}x^2 + \frac{1}{50}x^4 + o(x^4)) - (x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5))}{x - (x - \frac{1}{5}x^3 + o(x^3))}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{5}x^3 + \frac{1}{50}x^5 + o(x^5)}{\frac{1}{5}x^3 + o(x^3)} = -2$

b. $\cos x < 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \approx < 0.995005$
 $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2} = 0.995$
 after rounding $\cos x \approx 0.9950$
 $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \approx 0.09983$
 $x \cos x = 0.0995$, $x \cos x - \sin x = -0.0003300$
 $x - \sin x = 0.0017$
 $\frac{x \cos x - \sin x}{x - \sin x} = -1.941$

$$c. \text{ 原式} = \frac{x(1-\frac{1}{2}x^2) - (x-\frac{1}{2}x^3)}{x - (x-\frac{1}{2}x^3)} = 2$$

$$d. \text{ part (b): } \frac{-1.99899998 - (-1.999)}{-1.99899998} = 0.029$$

$$\text{part (c): } \frac{-1.99899998 - (-2)}{-1.99899998} = 0.0005$$

$$17(b) \quad x_0 y_1 = 1.31 \times 4.76 = 6.2356 \approx 6.24$$

$$x_1 y_0 = 1.93 \times 3.24 = 6.2532 \approx 6.25$$

$$\frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} = -0.00658 = P_1 \text{ ①}$$

$$x_1 - x_0 = 0.620$$

$$(x_1 - x_0) y_0 = 2.01$$

$$\frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0} = 1.32$$

$$x_0 - 1.32 = -0.0100 = P_2 \text{ ②}$$

$$\text{③: } p = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} = -0.0116$$

$$\left| \frac{P_1 - P}{P} \right| = 0.763 \quad \left| \frac{P_2 - P}{P} \right| = 0.138$$

The second method is better because its multiplication operations is more.

$$\text{p38 \#7} \quad a. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \frac{1}{6}h^3 + o(h^4)}{h} = 1 - \frac{1}{6}h^2 + o(h^2), \quad o(h^2)$$

$$b. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh h}{h} = \frac{1 - (1 + \frac{1}{2}h^2 + o(h^2))}{h} = -\frac{1}{2}h + o(h^2), \quad o(h)$$

$$c. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh h - h \cosh h}{h} = \frac{h - \frac{1}{6}h^3 + o(h^4) - h(1 + \frac{1}{2}h^2 + o(h^2))}{h} = \frac{\frac{1}{6}h^3 + o(h^4) - \frac{1}{2}h^3 + o(h^3)}{h} = -\frac{1}{6}h + o(h), \quad o(h)$$

$$d. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh h + h \sinh h}{h} = \frac{1 - (1 + \frac{1}{2}h^2 + o(h^2)) + h(\frac{1}{2}h + o(h))}{h} = \frac{-\frac{1}{2}h^2 + o(h^2) + \frac{1}{2}h^2 + o(h^2)}{h} = o(h)$$

$$= -\frac{1}{6}h + o(h), \quad o(h)$$

2) 一元方程求解

Attention

- 这是 bisection 的特性

P54 13 为了便 $|p_n - p| \leq 10^{-4}$
$\frac{1}{n} (b-a) \leq 10^{-4}$
 $2^n \geq 10^4$
 $n \geq 14$, $p_{14} = 1.32477$
15 此数列为调和级数, 为发散
由于 $p_{2n} - p_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2}$
不满足柯西收敛准则

The order in descending speed of convergence is (b), (d), (a). The sequence in (c) does not converge.

Info

- 求不动点交点处的导数, 导数绝对值越小越收敛

Example: Find the unique root of the equation $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ in $[1, 2]$. Using the following equivalent fixed-point forms with $p_0 = 1.5$, which one is the best? (The root is approximately 1.365230013.)

~~a~~ $x = g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$; ~~b~~ $x = g_2(x) = \sqrt{10/x - 4x}$;

c $x = g_3(x) = \sqrt{10 - x^3} / 2$; d $x = g_4(x) = \sqrt{10/(4+x)}$;

e $x = g_5(x) = x - \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x}$;



OK in $[1, 1.5]$.
 $k \approx 0.66$

$k \approx 0.15$



But why? 导数小于1

Attention

这里注意不断把函数值变成 k 乘以 x 的差 不断迭代

19. (a). $ x_n - x = g(x_{n+1}) - g(x) = g'(\xi_n) \cdot x_{n+1} - x \leq k x_{n+1} - x $
$\therefore x_n - x \leq k x_{n+1} - x \leq \dots \leq k^n x_0 - x \rightarrow 0$
$\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0, \therefore x_n - x \rightarrow 0$
又. $x = \sqrt{2}, x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{x} \therefore$ 收敛于 $\sqrt{2}$
(b) $x_1 = \frac{x_0^2 + 2}{2x_0} \therefore 0 < (x_0 - \sqrt{2})^2$
$\therefore x_0^2 + 2 > 2\sqrt{2}x_0$
$\therefore x_1 = \frac{x_0^2 + 2}{2x_0} > \sqrt{2}$
(c). i) 最初 $x_0 = \sqrt{2}$ 时, 由于 $x_1 = \frac{1}{2}x_0 + \frac{1}{x_0} = \sqrt{2}$, 将恒收敛于 $\sqrt{2}$
ii) $x_0 > \sqrt{2}$ 时, 根据 a), 收敛于 $\sqrt{2}$
iii) $x_0 < \sqrt{2}$ 时, $x_1 > \sqrt{2}$, 再根据 ii), 收敛于 $\sqrt{2}$

3) 一元方程迭代法收敛性分析 & 矩阵求解初步

- 利用泰勒展开进行迭代计算

(1) 误差更新公式

用泰勒展开对 $g(p_n)$ 进行近似:

$$g(p_n) = g(p) + g'(p)(p_n - p) + \frac{g''(\xi_n)}{2}(p_n - p)^2,$$

其中 ξ_n 是 p_n 和 p 之间的某点。

由于 $g(p) = p$, 迭代公式可写为:

$$p_{n+1} - p = g'(p)(p_n - p) + \frac{g''(\xi_n)}{2}(p_n - p)^2.$$

11. If $\frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^3} = 0.75$ and $|p_0 - p| = 0.5$, then

$$|p_n - p| = (0.75)^{(3^n - 1)/2} |p_0 - p|^{3^n}.$$

To have $|p_n - p| \leq 10^{-8}$ requires that $n \geq 3$.

1.0 INPUT number of unknown and equations n ; augmented matrix $A = (a_{ij})$, where $1 \leq i \leq n$ and $1 \leq j \leq n+1$

Output solution $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ or message that the linear system has no unique solution

Step 1. For $i=1, \dots, n-1$ do Steps 2-4

Step 2. Let p be the smallest integer with $i \leq p \leq n$ and $a_{pi} \neq 0$ if not found: Output ('no unique solution exists'), STOP

Step 3. If $p \neq i$ then perform $(E_p) \leftrightarrow (E_i)$

Step 4. For $j=1, 2, \dots, i-1, i+1, i+2, \dots, n$ do Steps 5 and

Step 5. Set $m_{ji} = a_{ji} / a_{ii}$

Step 6. Perform $(E_j - m_{ji} E_i) \rightarrow (E_j)$

Step 7. If $a_{nn} = 0$ then Output ('no unique solution exists'), STOP

Step 8. For $i=n-1, \dots, 1$, set $x_i = (a_{i,n+1} / a_{ii})$

Step 9. Output $(x_1, \dots, x_n)$; STOP

P398 #11 After an operation at line k ($1 \leq k \leq n$), we have

$(n-1)$ times multiplications/divisions ^{add} $(n-k)(n-1)$ multiplications/divisions, ^{another}

$(n-k+1)(n-1)$ times additions/subtractions and n times divisions.

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^{n-1} (2n-1) + (n-k)(n-1) = \frac{n^3 + 2n^2 - n}{2}$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^{n-1} (n-k+1)(n-1) = \frac{n^3}{2} - \frac{n}{2}$$

P397 #7. (1) $\textcircled{1} \sum_{k=1}^n (n-k)(n-k) + n-k = \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n (n-k)^2 = \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$$

(2) $\textcircled{1} \sum_{k=1}^n (k-1) = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$ $\textcircled{2} \sum_{k=1}^n (k-1) = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$

(3) To solve $Ux=y$, what we need to do is to divide E_i by U_{ii} , and then the same operations as (2), that is, $\frac{1}{2}n^2 + \frac{n}{2}$ for multiplications/divisions

$\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$ for additions/subtractions. ~~*~~ Totally we need $\frac{1}{3}n^3 + n^2 - \frac{1}{3}n$ and $\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{5}{6}n$

(4) all the operations for $Ly=b$ and $Ux=y$ are m times than (3), so in total $\frac{1}{3}n^3 + mn^2 - \frac{1}{2}n$ / $\frac{1}{3}n^3 + (m-1)n^2 - (m-1)n$

Attention

高斯约当消元 相比高斯消元的 上三角矩阵, 是一个 单位矩阵

4) Choleski 分解 & 迭代线性系统解法初步

- 在上面那张图片中

17. Let

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ \beta & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Find all values of α and β for which

- A is singular.
- A is strictly diagonally dominant.
- A is symmetric.
- A is positive definite.

P412 #17

(a). $|A| = 4\alpha - \alpha - 2\beta = 0, \quad 3\alpha = 2\beta$

(b). $|A| > 1 \quad \therefore |\alpha| > 1, |\beta| < 1.$
 $|1\beta| + 1 < 2$

(c). $\beta = 1$

(d). $\alpha > 0 \quad \therefore \alpha > \frac{2}{3}, \beta = 1$
 $2\alpha - 1 > 0$
 $4\alpha - \alpha - 2 > 0$

5) 矩阵迭代解法与插值

- 范数

矩阵范数

$\mathbf{R}^{n \times n}$ 上的矩阵范数是一个函数 $\|\cdot\| : \mathbf{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbf{R}$, 满足下列条件:

- $\|\mathbf{A}\| \geq 0$, 且 $\|\mathbf{A}\| = 0$ 当且仅当 $\mathbf{A}$ 是零矩阵; ($\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$)
- $\|\alpha \mathbf{A}\| = |\alpha| \|\mathbf{A}\|$, 其中 $\alpha \in \mathbf{R}, \mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$;
- $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$. ($\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbf{R}^{n \times n}$)
- $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$. ($\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbf{R}^{n \times n}$)

矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 之间的距离定义为 $\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|$.

$\mathbf{R}^n$ 上的向量范数是一个函数 $\|\cdot\|: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, 满足下列条件:

1. $\|\mathbf{x}\| \geq 0$, 且 $\|\mathbf{x}\| = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$; ($\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$)
2. $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha|\|\mathbf{x}\|$, 其中 $\alpha \in \mathbf{R}, \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$;
3. $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ 。 ($\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$)

- 根据谱半径 看是否收敛

(a) 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- **特性: 对称矩阵, 正定矩阵。**
- **特征值:** 解 $\det(A - \lambda I) = 0$, 得:

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3。$$

- **谱半径:** $\rho(A) = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|\} = 3。$

P436 #3. C is convergent.

P453 #13 $T_w = (D-wL)^{-1}(I-w)D + (D-wL)^{-1}wU$

$$\therefore \|T_w\| = \|D^{-1}\|(\|C-wL\|D) + \|D^{-1}\|w\|U\|$$

$$= \|D^{-1}\|(\|C\| + w\|L\|D + w\|U\|)$$

$$= \|D^{-1}\|(\|C\| + w\|L\|D + w\|U\|)$$

$$= \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \leq [\rho(A)]^n = 1$$

$\therefore w \in (0, 2)$

6) 条件数与特征向量

一个 $n \times n$ 的希尔伯特矩阵是一个特殊矩阵, 其元素定义为:

$$H_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n。$$

例如, 3x3 的希尔伯特矩阵 H 为:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.3333 \\ 0.5 & 0.3333 & 0.25 \\ 0.3333 & 0.25 & 0.2 \end{bmatrix}。$$

#1. a. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 18 & -24 \\ -24 & 36 \end{bmatrix}$, $\|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = 18 \cdot 50$

b. $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{6.744 - (-3.72)} \begin{bmatrix} 6.744 & -3.72 \\ -15.814 & 9.07 \end{bmatrix}$
 $\|A^{-1}\|_{\infty} = 24.884$, $K(A) = 241.2$

c. $A^{-1} = \begin{bmatrix} -100000 & 100000 \\ 50000.5 & -50000 \end{bmatrix}$
 $\therefore \|A^{-1}\|_{\infty} = 200000$, $K_{\infty}(A) = 6.000062$

d. $A^{-1} = 0.3659 \times \begin{bmatrix} 321.8 & -58.09 \\ -5.55 & 1.003 \end{bmatrix}$
 $\therefore \|A^{-1}\|_{\infty} = 139.1028^{23}$, $K_{\infty}(A) = 339864.19$

e. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\|A^{-1}\|_{\infty} = 4$
 $\therefore K_{\infty}(A) = 12$

f. $K(A) = 198.17$

#9. $H = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.3333 \\ 0.5 & 0.3333 & 0.25 \\ 0.3333 & 0.25 & 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.3333 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.3333 \\ 0 & 0.0833 & 0.0833 \\ 0 & 0 & 0.0056 \end{bmatrix}$
 $H \cdot H^{-1} = I$, $\therefore LUH^{-1} = I$, 设 $Y = UH^{-1}$, $Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.167 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
 $\therefore \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.3333 \\ 0 & 0.0833 & 0.0833 \\ 0 & 0 & 0.0056 \end{bmatrix} H^{-1} = Y$, $H^{-1} = \begin{bmatrix} 8.968 & -35.77 & 29.77 \\ -2.77 & 19.06 & -17.86 \\ 29.77 & -17.86 & 17.86 \end{bmatrix}$
同理, $\hat{H} = \begin{bmatrix} 0.9799 & 0.4870 & 0.3538 \\ 0.4866 & 0.3246 & 0.2434 \\ 0.3232 & 0.2433 & 0.1999 \end{bmatrix}$
 $\|H - \hat{H}\|_{\infty} = 0.0426$

7) 拉格朗日插值+牛顿多项式插值法+Hermit 插值

- 第十七题就是要求误差在限定范围的最大步长, (线性插值) 公式在 ppt 中有

$$p_{n9} \#5 \quad p_0 = \frac{1}{9}, p_1 = \frac{1}{3}, p_2 = 1, p_3 = 3, p_4 = 9.$$

$$p_{01} = \frac{5}{9} + \frac{2}{9}\sqrt{2} = \frac{5}{9}, p_{12} = \frac{4}{3}, p_{23} = 2, p_{34} = 0.$$

$$p_{02} = \frac{3}{2}, p_{13} = \frac{1}{6}, p_{24} = -\frac{3}{2}.$$

$$p_{03} = \frac{11}{9}, p_{14} = \frac{5}{3}.$$

$$p_{04} = \frac{41}{24} \quad \therefore \sqrt{2} \approx \frac{41}{24}$$

$$p_{20} \#17 \quad 1 - \frac{f''(b)}{2!} (x - (k+1)h)(x - kh) \leq \frac{h}{8 \ln 10} = \frac{1}{8 \ln 10}$$

$$h \leq 0.0049, \text{ 选择 } h = 0.004 \text{ 确保密除 } 9$$

• 牛顿前向差分

基本公式

$$f(x) \approx f(x_0) + p\Delta f(x_0) + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f(x_0) + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}\Delta^3 f(x_0) + \dots$$

其中:

- $x_0, x_1, x_2, \dots$ 是等距数据点, 步长为 $h = x_{i+1} - x_i$.
- $p = \frac{x - x_0}{h}$, 表示插值点与起始点的相对位置.
- $\Delta f(x_i)$ 是前向差分表中的差分值:
 - 一阶前向差分: $\Delta f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i)$.
 - 二阶前向差分: $\Delta^2 f(x_i) = \Delta f(x_{i+1}) - \Delta f(x_i)$.
 - 三阶前向差分: $\Delta^3 f(x_i) = \Delta^2 f(x_{i+1}) - \Delta^2 f(x_i)$, 以此类推.

• 后向差分

基本公式

$$f(x) \approx f(x_n) + p\nabla f(x_n) + \frac{p(p+1)}{2!}\nabla^2 f(x_n) + \frac{p(p+1)(p+2)}{3!}\nabla^3 f(x_n) + \dots$$

其中：

- $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 是等距数据点，步长为 $h = x_{i+1} - x_i$ 。
- $p = \frac{x-x_n}{h}$ ，表示插值点与末尾点的相对位置。
- $\nabla f(x_i)$ 是后向差分表中的差分值：
 - 一阶后向差分： $\nabla f(x_i) = f(x_i) - f(x_{i-1})$ 。
 - 二阶后向差分： $\nabla^2 f(x_i) = \nabla f(x_i) - \nabla f(x_{i-1})$ 。
 - 三阶后向差分： $\nabla^3 f(x_i) = \nabla^2 f(x_i) - \nabla^2 f(x_{i-1})$ ，以此类推。

- 差商（PPT 上应该也有）

前向差商公式回顾

1. 零阶差商：

$$f[x_0] = f(x_0), f[x_1] = f(x_1), f[x_2] = f(x_2)$$

零阶差商是直接使用函数值。

2. 一阶差商：

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

3. 二阶差商：

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$$

这些公式可以递归地从已知值推导出更高阶的差商。

8) Hermit+Cubic Spline 插值+逼近初步

- hermit 插值介绍，其中对于 h g 函数的也是一种估计
- 金老师的笔记里有详解，每个条件都要在多项式加上，只是前面的“项数”，即我们要估计的函数，有时候 1 有时候 0；对于 n 个条件，要构造 n 次多项式，所以根据条件不同，要稍加变化

基于拉格朗日插值基函数⁺的Hermite插值多项式方法的基本思想是构造基函数为

$h_i(x), g_i(x), i = 0, 1$ $H_3(x) = y_0 h_0(x) + y_1 h_1(x) + m_0 g_0(x) + m_1 g_1(x)$ 其中 $h_i(x)$ 和 $g_i(x)$ 在插值节点处满足相应的函数值和导数条件。具体条件见下表：

$h_0(x_0) = 1$	$h_0(x_1) = 0$	$h'_0(x_0) = 0$	$h'_0(x_1) = 0$
$h_1(x_0) = 0$	$h_1(x_1) = 1$	$h'_1(x_0) = 0$	$h'_1(x_1) = 0$
$g_0(x_0) = 0$	$g_0(x_1) = 0$	$g'_0(x_0) = 1$	$g'_0(x_1) = 0$
$g_1(x_0) = 0$	$g_1(x_1) = 0$	$g'_1(x_0) = 0$	$g'_1(x_1) = 1$

因为 $h_0(x_0) = 1$ $h_0(x_1) = 0$ $h'_0(x_0) = 0$ $h'_0(x_1) = 0$ 由函数导数的零点和函数的关系，我们可以构造 $h_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b)$ 由函数值条件 $h_0(x_0) = 1, h'_0(x_0) = 0$ ，将其带入 $h_0(x)$ 中，求解线性方程组，我们可以得到

$$a = -\frac{2}{(x_0 - x_1)^3}, \quad b = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2} + \frac{2x_0}{(x_0 - x_1)^3}, \quad \text{于是我们便可以得到}$$

$$h_0(x) = \frac{(x - x_1)^2}{(x_0 - x_1)^2} \left(1 + \frac{2x_0}{x_0 - x_1} - \frac{2x}{x_0 - x_1} \right) = \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 = (1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x)$$

同理

$$h_0(x) = (1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x) = \left(1 + 2\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$h_1(x) = (1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x) = \left(1 + 2\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

$$g_0(x) = (x - x_0) \cdot l_0^2(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$g_1(x) = (x - x_1) \cdot l_1^2(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

于是将 $h_i(x), g_i(x), i = 0, 1$ 带入插值多项式中可得

$$H_3(x) = h_0(x) + y_1 h_1(x) + m_0 g_0(x) + m_1 g_1(x)$$

$$\begin{aligned} &= y_0 (1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x) + y_1 (1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x) + m_0 (x - x_0) \cdot l_0^2(x) \\ &\quad + m_1 (x - x_1) \cdot l_1^2(x) \\ &= y_0 \left(1 + 2\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 + y_1 \left(1 + 2\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 \\ &\quad + m_0 (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 + m_1 (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 \end{aligned}$$

于是便得到了Hermite插值多项式

The Hermite polynomial generated from these data is

$$\begin{aligned} H_9(x) &= 75x + 0.222222x^2(x - 3) - 0.0311111x^2(x - 3)^2 - 0.00644444x^2(x - 3)^2(x - 5) \\ &\quad + 0.00226389x^2(x - 3)^2(x - 5)^2 - 0.000913194x^2(x - 3)^2(x - 5)^2(x - 8) \\ &\quad + 0.000130527x^2(x - 3)^2(x - 5)^2(x - 8)^2 - 0.0000202236x^2(x - 3)^2(x - 5)^2(x - 8)^2(x - 13). \end{aligned}$$

- a. The Hermite polynomial predicts a position of $H_9(10) = 743$ ft and a speed of $H'_9(10) = 48$ ft/s. Although the position approximation is reasonable, the low speed prediction is suspect.
- b. To find the first time the speed exceeds 55 mi/h ≈ 80.6 ft/s, we solve for the smallest value of t in the equation $80.6 = H'_9(x)$. This gives $x \approx 5.6488092$.
- c. The estimated maximum speed is $H'_9(12.37187) = 119.423$ ft/s ≈ 81.425 mi/h.

P153 #9. $S_0(\frac{1}{2}) = 1$, $\therefore B = D = \frac{1}{4}$, $b = -\frac{1}{2}$, $d = \frac{1}{4}$.
 $\left. \begin{aligned} S_0(2) &= S_1(2) = 1 \\ S_1(3) &= 0. \\ S'_0(2) &= S'_1(2). \\ S''_0(2) &= S''_1(2) \end{aligned} \right\}$
 #17
$$F(x) = \begin{cases} 20(e^{0.1} - 1)x + 1 & x \in [0, 0.05) \\ 20(e^{0.2} - e^{0.1})x + 2e^{0.1} - 2e^{0.2} & x \in [0.05, 1) \end{cases}$$

 $\therefore \int_0^1 F(x) dx = 0.110795, \quad \int_0^1 e^{2x} dx = 0.1107$

- jiepeng lab 里的一个例子

特殊例子 ¶

假设 $x_0 \neq x_1 \neq x_2$, 给定 $f(x_0), f(x_1), f(x_2), f'(x_1)$, 找到多项式使得 $P(x_i) = f(x_i)$, $P'(x_1) = f'(x_1)$ 。

首先, 其次数为3次, 我们猜想其形式为

$$P(x) = \sum_{i=0}^2 f(x_i)h_i(x) + f'(x_1)\hat{h}_1(x)$$

其中 $h_i(x_j) = \delta_{ij}$, $h'_i(x_1) = 0$, $\hat{h}_1(x_i) = 0$, $\hat{h}'_1(x_1) = 1$ 。

根据这个猜想, 我们试图构造出 $h_i(x)$ 和 $\hat{h}_1(x)$ 。

首先, 我们可以用拉格朗日同样的方法构造出三次多项式 $h_i(x)$, 使得 $h_i(x_j) = \delta_{ij}$, $h'_i(x_1) = 0$, $i = 0, 1, 2$ 。

对于 $h_0(x)$, 有根 x_1, x_2 , 且因为 $h'_0(x_1) = 0$ 所以 x_1 是 $h_0(x)$ 的二重根, 所以其形式为

$$h_0(x) = C_0(x - x_1)^2(x - x_2)$$

又因为 $h'_0(x_0) = 1$, 所以

$$h_0(x) = \frac{(x - x_1)^2(x - x_2)}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)}$$

类似地, 我们可以得到

$$h_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)^2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)^2}$$

对于 $h_1(x)$, 有根 x_0, x_2 , 都是单根。所以其形式为

$$h_1(x) = (Ax + B)(x - x_0)(x - x_2)$$

通过计算 $h_1(x_1) = 1$, $h'_1(x_1) = 0$, 可以得到 A 和 B 的值。此处略。

然后, 我们构造 $\hat{h}_1(x)$, 使得 $\hat{h}_1(x_i) = 0$, $\hat{h}'_1(x_1) = 1$ 。对于 $\hat{h}_1(x)$, 有根 x_0, x_1, x_2 , 所以

$$\hat{h}_1(x) = C(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

又因为 $\hat{h}'_1(x_1) = 1$, 所以可以通过计算得到 C 的值。此处略。

9) 逼近+Chebyshev 多项式

- 最小二乘法看金老师笔记
- 算了, 我自己也搞一份

离散例子

可以证明, 离散时的式子也是这样的。

Discussion 22: Approximate $\frac{x}{y} \mid \frac{1}{4} \mid \frac{2}{10} \mid \frac{3}{18} \mid \frac{4}{26}$ with $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$ and $w \equiv 1$.

Solution: $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = x^2$

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=1}^4 1 \cdot 1 = 4 \quad (\varphi_1, \varphi_2) = \sum_{i=1}^4 x_i \cdot x_i^2 = 100$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=1}^4 1 \cdot x_i = 10 \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=1}^4 x_i^2 = 30$$

$$(\varphi_0, \varphi_2) = \sum_{i=1}^4 1 \cdot x_i^2 = 30 \quad (\varphi_2, \varphi_2) = \sum_{i=1}^4 x_i^4 = 354$$

$$(\varphi_0, y) = \sum_{i=1}^4 1 \cdot y_i = 58 \quad (\varphi_1, y) = 182 \quad (\varphi_2, y) = 622$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 10 & 30 \\ 10 & 30 & 100 \\ 30 & 100 & 354 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 \\ 182 \\ 622 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} a_0 = -\frac{3}{2}, a_1 = \frac{49}{10}, a_2 = \frac{1}{2} \\ y = P(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{49}{10}x - \frac{3}{2} \end{matrix}$$

$$\|B\|_{\infty} = 484, \quad \|B^{-1}\|_{\infty} = \frac{63}{4} \rightarrow K(B) = 7623$$

Prob #5 (1) $(\varphi_0, \varphi_0) = 10$, $(\varphi_0, \varphi_1) = 54.1$, $(\varphi_1, \varphi_1) = 303.39$

$(\varphi_0, y) = 1958.39$, $(\varphi_1, y) = 11366.8$.

$\therefore y = 72.08x - 194.12$, $\text{error} = \sum_{i=1}^2 (y_i - (a+bx_i))^2 = 329.01$

(2) $(\varphi_0, \varphi_2) = 303.39$, $(\varphi_1, \varphi_2) = 759.83$, $(\varphi_2, \varphi_2) = 1023.1$

$(\varphi_2, y) = 68006.7$, $\therefore y = 6.62x^2 - 1.14x + 1.29$, $\text{error} = 1.44 \times 10^{-3}$

(3) $(\varphi_2, \varphi_3) = 64608$, $(\varphi_3, \varphi_3) = 405617$, $(\varphi_3, y) = 417730$

$\therefore y = -0.014x^3 + 6.85x^2 - 2.38x + 3.43$, $\text{error} = 0.00053$

(4) 设 $Y = \ln y$, $B = \ln b$, 则方程为 $Y = B + aX$

$(\varphi_0, Y_0) = 52.0336$, $(\varphi_1, Y_0) = 285.49$

$y = 24.26 \cdot e^{0.57x}$, $\text{error} = 417.69$

(5) 设 $Y = \ln y$, $B = \ln b$, $X = \ln x$, $Y = B + aX$

$(\varphi'_0, \varphi'_1) = 16.700$, $(\varphi'_1, \varphi'_1) = 32.102$, $(\varphi'_0, Y_0) = 52.0336$,

$(\varphi'_1, Y_0) = 87.633$, $y = 6.24x^{2.02}$, $\text{error} = 0.067$

Prob #3 a. $(\varphi_0, \varphi_0) = 2$, $(\varphi_0, \varphi_1) = 0$, $(\varphi_1, \varphi_1) = \frac{2}{3}$, $(\varphi_0, Y) = \frac{20}{3}$, $(\varphi_1, Y) = -\frac{4}{3}$

$\therefore P_1(x) = -2x + \frac{10}{3}$

b. $(\varphi_0, \varphi_0) = 2$, $(\varphi_0, \varphi_1) = 0$, $(\varphi_1, \varphi_1) = \frac{2}{3}$, $(\varphi_0, Y) = 0$, $(\varphi_1, Y) = \frac{2}{5}$

$\therefore P_2(x) = \frac{7}{5}x - 0.6x$

c. $(\varphi_0, Y) = \ln 3$, $(\varphi_1, Y) = 2 - 2\ln 3$, $\therefore P_3(x) = 0.55 - 0.30x$

d. $\langle \varphi_0, y \rangle = e^{-\frac{1}{2}}$, $\langle \varphi_1, y \rangle = \frac{2}{e}$, $\therefore P_4(x) = 1.1x + 1.18$

e. $\langle \varphi_0, y \rangle = \sin 1$, $\langle \varphi_1, y \rangle = -\frac{1}{3}\cos 2 + \frac{1}{6}\sin 2$, $P(x) = 0.435x + 0.42$

f. $\langle \varphi_0, y \rangle = 3\ln 3 - 2$, $\langle \varphi_1, y \rangle = 2 - \frac{3}{2}\ln 3$, $\therefore P(x) = 0.53x + 0.65$

#11 $B_1 = \frac{f(x, t)}{(1, 1)} = 1$, $L_1(x) = x - 1$, $B_2 = 3$, $C_2 = 1$, $L_2(x) = x^2 - 4x + 2$

$B_3 = 5$, $C_3 = 4$, $\therefore L_3 = x^3 - 9x^2 + 18x - 6$

• 上面这个正交化的公式如下:

我们可以构造出一系列的正交多项式。用下面定义的多项式函数集 $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x)\}$ 关于权函数 $w(x)$ 是正交的：

$$\phi_0(x) = 1, \quad \phi_1(x) = x - B_1, \quad \phi_k(x) = (x - B_k)\phi_{k-1}(x) - C_k\phi_{k-2}(x), \quad k = 2, 3, \dots$$

其中 B_k 和 C_k 是常数，可以通过

$$B_k = \frac{\langle x\phi_{k-1}, \phi_{k-1} \rangle}{\langle \phi_{k-1}, \phi_{k-1} \rangle}, \quad C_k = \frac{\langle x\phi_{k-1}, \phi_{k-2} \rangle}{\langle \phi_{k-2}, \phi_{k-2} \rangle}$$

来计算。

Example: Approximate $\frac{x}{y} \mid \frac{1}{4} \mid \frac{2}{10} \mid \frac{3}{18} \mid \frac{4}{26}$ with $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ and $w \equiv 1$.

Solution: First construct the orthogonal polynomials $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x)$.

Let $y = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + a_2\varphi_2(x)$

$$\varphi_0(x) = 1 \quad a_0 = \frac{(\varphi_0, y)}{(\varphi_0, \varphi_0)} = \frac{29}{2}$$

$$a_k = \frac{(\varphi_k, y)}{(\varphi_k, \varphi_k)}$$

$$B_1 = \frac{(x\varphi_0, \varphi_0)}{(\varphi_0, \varphi_0)} = \frac{5}{2} \quad \varphi_1(x) = (x - B_1) = x - \frac{5}{2} \quad a_1 = \frac{(\varphi_1, y)}{(\varphi_1, \varphi_1)} = \frac{37}{5}$$

$$B_2 = \frac{(x\varphi_1, \varphi_1)}{(\varphi_1, \varphi_1)} = \frac{5}{2} \quad C_2 = \frac{(x\varphi_1, \varphi_0)}{(\varphi_0, \varphi_0)} = \frac{5}{4}$$

$$\varphi_2(x) = (x - \frac{5}{2})\varphi_1(x) - \frac{5}{4}\varphi_0(x) = x^2 - 5x + 5 \quad a_2 = \frac{(\varphi_2, y)}{(\varphi_2, \varphi_2)} = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow y = \frac{29}{2} \times 1 + \frac{37}{5} (x - \frac{5}{2}) + \frac{1}{2} (x^2 - 5x + 5) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{49}{10}x - \frac{3}{2}$$

里面各项已经在之前的图片中计算过了。

10) chebyshev 多项式+数值微分与积分

Error

这里的 #7 有点问题，应该一个个降低，直到遇到不精确之后退回上一个版本

#3. $x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)$, $k=1,2,3,4$, $n=4$

$\therefore x_1 = 0.9239, x_2 \approx 0.3827, x_3 \approx -0.3827, x_4 \approx -0.9239$

$\therefore a. P_3(x) = 2.5190 + 1.945(x - 0.9239) + 0.7047(x - 0.9239)(x - 0.3827) + 0.1751(x - 0.9239)(x - 0.3827)(x + 0.3827)$

b. $P_3(x) = 0.7979 + 0.7844(x - 0.9239) - 0.1464(x - 0.9239)(x - 0.3827) - 0.1585(x - 0.9239)(x - 0.3827)(x + 0.3827)$

c. $P_3(x) = 1.0730 + 0.3782(x - 0.9239) - 0.0980(x - 0.9239)(x - 0.3827) + 0.0491(x - 0.9239)(x - 0.3827)(x + 0.3827)$

d. $P_3(x) = 0.7286 + 1.3066(x - 0.9239) + 1.0000(x - 0.9239)(x - 0.3827)$

#7. $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$

$|R_n(x)| \leq \frac{1}{2^{n(n+1)}!} < \frac{1}{100}, n \geq 3$

$T_0(x) = 1, T_1(x) = x, T_2(x) = 2x^2 - 1, T_3(x) = 4x^3 - 3x$

$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1, T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$

$\therefore [f(x)]' = P_2 = P_3 - 0.25 = \frac{383}{384}x - \frac{5}{2}x^3$

#9 $\int_{-1}^1 \frac{[f(x)]^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi \frac{[2 \cos(n \arccos(x))]^2}{\sin \theta} \sin \theta d\theta = \int_0^\pi [\cos(n\theta)]^2 d\theta$

$$= \int_0^\pi \frac{1}{2} d\theta + \int_0^\pi \frac{\cos(2n\theta)}{2} d\theta = \frac{1}{2}\pi$$

Attention

一是用切比雪夫逼近，二是用其降低阶数，在 notebook 中(切比雪夫多项式有两种等价的定义)

- 三点法和五点法

三点中心差分公式用于计算一阶导数 $f'(x)$:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

其误差来源于泰勒展开的高阶项，误差阶数为 **二阶**，具体形式为:

$$\text{误差} = -\frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi),$$

其中 $\xi \in [x-h, x+h]$.

五点中心差分公式用于计算一阶导数 $f'(x)$:

$$f'(x) \approx \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h}.$$

其误差来源于泰勒展开的高阶项, 误差阶数为 **四阶**, 具体形式为:

$$\text{误差} = -\frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi),$$

其中 $\xi \in [x-2h, x+2h]$.

P176 #7 $f'(3) = \frac{-f(5) + 8f(4) - 8f(2) + f(1)}{12} = 0.2106.$
error $\leq \frac{1^4}{30} \times 23 = 0.767.$
#13. $f''(0.5) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left[\frac{\pi}{2} - 0 + (-\frac{\pi}{2})\right] = 0.$
 $f^{(4)}(x) = x^4 \cos \pi x, \quad \text{error} < \frac{1}{24 \times 16} \times 2 \times 1 = 0.51.$
because the function is symmetric at 0.5.

11) 数值积分

P195 #7. given that $\frac{2-0}{2} \times (f(0) + f(2)) = 4$
 $\frac{2-1}{3} (f(0) + 4f(1) + f(2)) = 2$
 $\therefore f(1) = -\frac{1}{4}, f(1) = \frac{1}{2}$

#9 对于 $f(x)=1$, $\int_{-1}^1 1 dx = f(-\frac{\sqrt{3}}{2}) + f(\frac{\sqrt{3}}{2}) = 2$

$f(x)=x$, $\int_{-1}^1 x dx = f(-\frac{\sqrt{3}}{2}) + f(\frac{\sqrt{3}}{2}) = 0$

$f(x)=x^2$, $\int_{-1}^1 x^2 dx = f(-\frac{\sqrt{3}}{2}) + f(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{2}{3}$

$f(x)=x^3$, $\int_{-1}^1 x^3 dx = f(-\frac{\sqrt{3}}{2}) + f(\frac{\sqrt{3}}{2}) = 0$

$f(x)=x^4$, $\int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$, $f(-\frac{\sqrt{3}}{2}) + f(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{2}{9}$

故精度为3

#11 $\begin{cases} 2 = C_0 + C_1 + C_2 & (f(x)=1) \\ 0 = -C_0 + C_2 & (f(x)=x) \\ \frac{2}{3} = C_0 + C_2 & (f(x)=x^2) \end{cases} \therefore C_0 = \frac{1}{3}, C_1 = \frac{4}{3}, C_2 = \frac{1}{3}$

#13. $f(x)=1: 1 = C_0 + C_1$
 $f(x)=x: \frac{1}{2} = C_1 x_1 \Rightarrow \begin{cases} C_0 = \frac{1}{4} \\ C_1 = \frac{3}{4} \\ x_1 = \frac{2}{3} \end{cases}$
 $f(x)=x^2: \frac{1}{3} = C_1 x_1^2$
 but $f(x)=x^3, \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}, C_0 + C_1 + C_2 = \frac{2}{9}$

Info

复合数值积分, 要求最大的步长 (等价于最少的步数)

Determine the values of n and h required to approximate

$$\int_0^2 e^{2x} \sin 3x dx$$

to within 10^{-4} .

- Use the Composite Trapezoidal rule.
- Use the Composite Simpson's rule.

204 #7 (a) $f(x) = 12e^{2x} \cos 3x - 5e^{2x} \sin 3x \geq 17e^4 705.36$
 when $\frac{(\frac{2}{n})^2}{12} \times \geq x17e^4 \leq 10^{-4}$. $n \geq 2487 2168.5$

(b) $f^{(n)}(x) = -119e^{2x} \sin 3x - 156e^{2x} \cos 3x \geq 27504 \geq -4475.41$
 $\therefore n \geq 54$

Example: Approximate $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx$ using Gaussian quadrature with $n = 1$.

Solution: Assume $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$

Step 1: Construct the orthogonal polynomial φ_2

Let $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x + a$, $\varphi_2(x) = x^2 + bx + c$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = 0 \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{x}(x + a) dx = 0 \Rightarrow a = -\frac{3}{5}$$

$$(\varphi_0, \varphi_2) = 0 \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{x}(x^2 + bx + c) dx = 0 \quad \rightarrow \quad b = -\frac{10}{9}$$

$$(\varphi_1, \varphi_2) = 0 \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{x}(x - \frac{3}{5})(x + bx + c) dx = 0 \quad c = \frac{5}{21}$$

$$\varphi_2(x) = x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{5}{21}$$

Step 2: Find the two roots of φ_2 which are the Gaussian points x_0 and x_1

$$x_{0:1} = \frac{10/9 \pm \sqrt{(10/9)^2 - 20/21}}{2}$$

Step 3: Since the formula must be accurate for $f(x) = 1, x$, we can easily solve a linear system of equations for A_0 and A_1 .

The results are the same as we have obtained:

$$x_0 \approx 0.8212, x_1 \approx 0.2899, A_0 \approx 0.3891, A_1 \approx 0.2776$$

Use this formula to approximate $\int_0^1 \sqrt{x} e^x dx$

$$\int_0^1 \sqrt{x} e^x dx \approx A_0 e^{x_0} + A_1 e^{x_1} = 0.3891 \times e^{0.8212} + 0.2776 \times e^{0.2899} \approx 1.2555$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}(2x-1) dx = 2/15$$

Accurate!

Attention

$A_1 A_2$ 的求法, 让 $f(x)=1$ $f(x)=x$ 得到两个等式

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

12) 微分方程数值解法：显式法与隐式法

p371 #5 (a) $\phi(t, w) = f(t, w) + \frac{h}{2} f'_t(t, w)$

$$w_{i+1} = w_i + h \phi(t_i, w_i)$$

$$\text{而 } f(t, y) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y), \text{ 而 } \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{2}{t}y + (2te^y + t^2e^y)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{2}{t} \end{aligned} \right.$$

初始: $t_0 = 1, w_0 = 0$,

$\therefore t = 1.5$, numerical $y(t) = 3.91098$, Exact $y = 3.96767$

$t = 2.0$, $y(t) = 18.46999$, $y = 18.683097$

(b) $y(t) \approx w_i + \frac{w_{i+1} - w_i}{t_{i+1} - t_i} (t - t_i)$

$y(1.25) \approx 0.135914$, $y(1.5) \approx 4.77733$, $y(1.75) \approx 7.74801$

p371 #10. 已知 $y''(t) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y)$

$$y'''(t) = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y} f + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} f^2$$

展开式: $f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) = f(t_i, y(t_i)) - h \frac{\partial f}{\partial t} - h \frac{\partial f}{\partial y} f(t_i, y(t_i))$
 $+ \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + O(h^3)$

$$f(t_{i+2}, y(t_{i+2})) = f(t_i, y(t_i)) - 2h \frac{\partial f}{\partial t} - 2h \frac{\partial f}{\partial y} f(t_i, y(t_i)) + 2h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + O(h^3)$$

代入 $y(t_{i+1}) = y(t_i) + ah f(t_i, y(t_i)) + bh f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) + ch f(t_{i+2}, y(t_{i+2}))$

整理后, $y(t_{i+1}) = y(t_i) + h[a f(t_i, y(t_i)) + b f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) + c f(t_{i+2}, y(t_{i+2}))]$

$$+ h^2[-b \frac{\partial f}{\partial t} - b \frac{\partial f}{\partial y} f(t_i, y(t_i)) - 2c \frac{\partial f}{\partial t} - 2c \frac{\partial f}{\partial y} f(t_i, y(t_i))]$$

$$+ h^3[\frac{b}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + 2c \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}]$$

$$\therefore \begin{cases} a+b+c=1 \\ -b-2c=\frac{1}{2} \\ \frac{b}{2}+2c=\frac{1}{6} \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a=\frac{23}{12} \\ b=\frac{4}{3} \\ c=\frac{5}{12} \end{cases}$$

$\therefore y(t_{i+1}) = y(t_i) + \frac{23}{12} h f(t_i, y(t_i)) - \frac{4}{3} h f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) + \frac{5}{12} h f(t_{i+2}, y(t_{i+2}))$

从泰勒展开公式:

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2!}y''(t_i) + \frac{h^3}{3!}y^{(3)}(t_i) + O(h^4)$$

注意:

- $y'(t_i) = f(t_i, y(t_i))$
- 根据微分方程, 可以写出:

$$y''(t_i) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}y'(t_i) = f_t + f_y f$$

$$y^{(3)}(t_i) = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}f + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}f^2 + \frac{\partial f}{\partial y}(f_t + f_y f)$$

2. 展开 $f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))$ 和 $f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))$:

类似地, 对 $f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))$ 进行泰勒展开:

$$f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) = f(t_i, y(t_i)) - hf_t - hf_y f + \frac{h^2}{2!}(f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2) + O(h^3)$$

对于 $f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))$, 由于时间间隔是 $2h$, 展开如下:

$$f(t_{i-2}, y(t_{i-2})) = f(t_i, y(t_i)) - 2hf_t - 2hf_y f + \frac{(2h)^2}{2!}(f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2) + O(h^3)$$

13) 微分方程数值解法: Runge-Kutta 法和稳定性

Attention

注意, 每一个 K_{n+1} 都依赖于 K_n , 除非是第一个

第⑩题的 K_4 回答有误

P280 #1 $t=0.5$ 时, $y_{pre} = y_0 + h \cdot f(t_0, y_0) = 0 + 0.5 \times 0 = 0$

$$\therefore y_1 = y_0 + \frac{h}{2} [f(t_0, y_0) + f(t_1, y_{pre})] = \frac{1}{8} e^{\frac{3}{4}}$$

$$y_{pre}' = y_1 + h \cdot f(t_1, y_1) = \frac{1}{4} e^{\frac{3}{4}}$$

$$\therefore y_2 = y_1 + \frac{h}{2} [f(t_1, y_1) + f(t_2, y_{pre}')] = \frac{1}{16} e^{\frac{3}{4}} + \frac{1}{4} e^{\frac{3}{4}}$$

approximation real

$t=0.5$ 0.560211 0.2836165

$t=1$ 5.30149 3.219099

#10. $t=0.5$ 时, $k_1 = f(t_0, y_0) = f(0, 0) = 0$

$$k_2 = f(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{h}{2} k_1) = f(\frac{1}{4}, 0) = \frac{1}{4} e^{\frac{3}{4}}$$

$$k_3 = f(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{h}{2} k_2) = f(\frac{1}{4}, \frac{1}{16} e^{\frac{3}{4}}) = \frac{1}{8} e^{\frac{3}{4}}$$

$$k_4 = f(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{h}{2} k_3) = f(\frac{1}{4}, \frac{1}{8} e^{\frac{3}{4}}) = 0$$

$$y_{\frac{1}{2}} = y_0 + \frac{1}{2} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = \frac{1}{16} e^{\frac{3}{4}}$$

$t=1$ 时 $k_1' = f(\frac{1}{2}, \frac{1}{16} e^{\frac{3}{4}}) = \frac{3}{8} e^{\frac{3}{4}} - \frac{1}{8} e^{\frac{3}{4}}$

$$k_2' = f(t_0 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{h}{2} k_1) = f(\frac{3}{4}, \frac{5}{32} e^{\frac{3}{4}}) = \frac{3}{4} e^{\frac{3}{4}} - \frac{5}{16} e^{\frac{3}{4}}$$

$$k_3' = f(t_0 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{h}{2} k_2) = f(\frac{3}{4}, \frac{3}{16} e^{\frac{3}{4}} - \frac{1}{16} e^{\frac{3}{4}}) = \frac{9}{128} e^{\frac{3}{4}} + \frac{3}{32} e^{\frac{3}{4}}$$

$$k_4' = f(t_0 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{h}{2} k_3) = f(\frac{3}{4}, \frac{9}{128} e^{\frac{3}{4}} + \frac{3}{32} e^{\frac{3}{4}}) = \frac{9}{16} e^{\frac{3}{4}} - \frac{9}{16} e^{\frac{3}{4}}$$

$$k_2' = f(\frac{3}{4}, \frac{1}{8} e^{\frac{3}{4}} + \frac{1}{32} e^{\frac{3}{4}}) =$$

approximation: $t=0.5$, $W_1 = 0.264625$, $t=1$, $W_2 = 1.48348$.

#13. 单点法: $k_1 = f(t_n, y_n) = -y_n + t_n + 1$

$$k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1) = -y_n - \frac{h}{2} k_1 + t_n + \frac{h}{2} + 1 = -y_n + \frac{h}{2} y_n - \frac{h}{2} (t_n + 1) + t_n + \frac{h}{2} + 1$$

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot k_2 = -h y_n + \frac{1}{2} h^2 y_n - \frac{1}{2} h^2 t_n + h t_n + h + y_n$$

修正欧拉法: $k_1 = -y_n + t_n + 1$; $y_{pre} = y_n + h \cdot k_1 = y_n - h y_n + h t_n + h$

$$k_2 = -y_n + h y_n - h t_n + t_n + 1, \therefore y_{n+1} = -h y_n + \frac{1}{2} h^2 y_n - \frac{1}{2} h^2 t_n + h t_n + h + y_n$$

何因, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_n + h, y_{pre}))$ (与上种方法相似)

$$= -h y_n + \frac{1}{2} h^2 y_n - \frac{1}{2} h^2 t_n + h t_n + h + y_n$$

原因: $f(t_n, y)$ 是线性函数

Attention

Adams Fourth-Order Predictor-Corrector Algorithm

1. 初始化:

- 使用单步法 (如四阶 Runge-Kutta 方法) 计算前四个点的值 y_0, y_1, y_2, y_3 。这是因为 Adams 方法需要至少 4 个点来启动。

2. Adams-Bashforth Predictor:

- 使用四阶 Adams-Bashforth 公式预测下一个点 y_{pred} 。

3. Adams-Moulton Corrector:

- 使用预测值 y_{pred} , 应用四阶 Adams-Moulton 公式修正得到 y_{corr} 。

4. 更新:

- 将修正值 y_{corr} 作为当前点的最终值, 并进入下一步。

5. 重复:

- 依次使用 Adams-Bashforth 方法预测, Adams-Moulton 方法校正, 直到覆盖整个区间。

Example

1. 初始化 (使用 Runge-Kutta 方法计算前 4 个点)

Adams 方法需要至少 4 个初始点, 因此我们使用 **四阶 Runge-Kutta 方法 (RK4)** 来计算

y_1, y_2, y_3, y_4 。

RK4 的公式:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

其中:

$$k_1 = hf(t_n, y_n), \quad k_2 = hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right), \quad k_3 = hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right), \quad k_4 = hf(t_n + h, y_n + k_3)$$

初始条件:

$$t_0 = 0, y_0 = 1$$

计算第 1 步:

$$t_1 = 0.2, \quad h = 0.2$$

$$k_1 = hf(t_0, y_0) = 0.2 \cdot (-2 \cdot 0 \cdot 1) = 0$$

$$k_2 = hf(t_0 + h/2, y_0 + k_1/2) = 0.2 \cdot (-2 \cdot 0.1 \cdot 1) = -0.04$$

$$k_3 = hf(t_0 + h/2, y_0 + k_2/2) = 0.2 \cdot (-2 \cdot 0.1 \cdot 0.98) = -0.0392$$

$$k_4 = hf(t_0 + h, y_0 + k_3) = \underset{\downarrow}{0.2} \cdot (-2 \cdot 0.2 \cdot 0.9608) = -0.076864$$

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 1 + \frac{1}{6}(0 - 0.08 - 0.0784 - 0.076864) \approx 0.96079$$

类似计算 y_2, y_3, y_4 , 得到:

$$t_2 = 0.4, y_2 \approx 0.85214$$

$$t_3 = 0.6, y_3 \approx 0.69767$$

$$t_4 = 0.8, y_4 \approx 0.51679$$

2. 开始使用 Adams 方法

我们已经得到了前 4 个点: $(t_0, y_0), (t_1, y_1), (t_2, y_2), (t_3, y_3), (t_4, y_4)$ 。

接下来, 使用 **Adams-Bashforth Predictor** 预测 y_{pred} , 然后用 **Adams-Moulton Corrector** 修正。

Adams-Bashforth Predictor (预测公式)

公式:

$$y_{\text{pred}} = y_n + h \cdot \frac{1}{24} (55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$$

对 $t_4 = 0.8, y_4 = 0.51679$ 预测 y_{pred} :

$$f_4 = f(t_4, y_4) = -2 \cdot 0.8 \cdot 0.51679 = -0.82786$$

$$f_3 = f(t_3, y_3) = -2 \cdot 0.6 \cdot 0.69767 = -0.83697$$

$$f_2 = f(t_2, y_2) = -2 \cdot 0.4 \cdot 0.85214 = -0.68171$$

$$f_1 = f(t_1, y_1) = -2 \cdot 0.2 \cdot 0.96079 = -0.38432$$

代入预测公式:

$$y_{\text{pred}} = y_4 + h \cdot \frac{1}{24} (55f_4 - 59f_3 + 37f_2 - 9f_1)$$

$$y_{\text{pred}} = 0.51679 + 0.2 \cdot \frac{1}{24} (55(-0.82786) - 59(-0.83697) + 37(-0.68171) - 9(-0.38432))$$

$$y_{\text{pred}} \approx 0.51679 - 0.2 \cdot 0.03426 = 0.51094$$

Adams-Moulton Corrector (校正公式)

公式:

$$y_{\text{corr}} = y_n + h \cdot \frac{1}{24} (9f_{\text{pred}} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$$

计算预测点的斜率:

$$f_{\text{pred}} = f(t_5, y_{\text{pred}}) = -2 \cdot 1.0 \cdot 0.51094 = -1.02188$$

代入校正公式:

$$y_{\text{corr}} = y_4 + h \cdot \frac{1}{24} (9(-1.02188) + 19(-0.82786) - 5(-0.83697) + (-0.68171))$$

$$y_{\text{corr}} \approx 0.51679 - 0.2 \cdot 0.03638 = 0.50951$$

3. 结果

在 $t = 1.0$ 时, 数值解为:

$$y(1.0) \approx 0.50951$$

如果需要更高精度, 可以减小步长 h 。通过重复预测-校正步骤, 可以依次得到整个区间内的近似解。

7. 使用线性模型 $f(t, w) = \lambda w$.

代入公式得, $w_{i+1} = -4w_i + 5w_{i-1} + 2h[\lambda w_i + \lambda w_{i-1}]$

$$w_{i+1} = (-4 + 2h\lambda)w_i + (5 + 4h^2\lambda)w_{i-1}$$
$$\begin{bmatrix} w_{i+1} \\ w_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4+2h\lambda & 5+4h^2\lambda \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ w_{i-1} \end{bmatrix}$$
$$\det \begin{bmatrix} -4+2h\lambda - p & 5+4h^2\lambda \\ 1 & -p \end{bmatrix} = 0$$
$$(-4+2h\lambda - p)(-p) - (5+4h^2\lambda) = 0$$
$$p^2 + (4-2h\lambda)p - (5+4h^2\lambda) = 0$$

无法使 $|p| \leq 1$, 方法不稳定.